



AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

DLP 12-11-01009016

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Auvergne

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°30 du 20 septembre 2001 - 1 page

Colza

Stade : cotylédons à 8 feuilles

Limaces

- Les attaques sont moins importantes que l'année dernière, mais il faut rester vigilant jusqu'au stade 4 feuilles.

Altises:

L'activité des altises est en regression mais certains secteurs de l'Allier ont subi des attaques importantes.

Seuil d'intervention :

3 pieds sur 10 avec morsures.

Tenthredines :

Des captures importantes d'adultes se poursuivent dans l'Allier alors quelles restent plus limitées dans le Puy de Dôme. Les premières fausses chenilles ont été observées dans plusieurs parcelles.

Réalisez régulièrement une observation car la défoliation réalisée par les larves peut être très rapide.

Choix des produits de prélevée :

Trois critères doivent vous conduire dans le choix du produit à appliquer :

- l'efficacité du produit vis à vis de la flore attendue. Vous trouverez dans les dépliants ci-joints les informations vous permettant d'effectuer votre choix.

- Le coût des différents traitements.

- L'aspect environnemental au sens large (toxicité pour l'applicateur, l'environnement...). Vous trouverez dans le paragraphe suivant quelques informations.

Info santé et environnement :

Les principales matières actives utilisées en prélevée :

| Matières actives | TH | TE | Fq |
|--------------------|----|----|-----|
| Chlortoluron | D | C | 8 % |
| Diflufenicanil | E | E | NON |
| Isoproturon | C | C | 4 % |
| Isoxaben | D | E | 0 % |
| Linuron | C | C | 1 % |
| Methabenzthiazuron | D | C | 2 % |
| Pendimethaline | D | B | 0 % |

TH : Toxicité pour l'homme

TE : Toxicité pour l'environnement
5 classes de A (dangereux) à E (peu dangereux)

Fq : Fréquence de détection dans l'eau sur 180 analyses réalisées à l'automne dans la région depuis 1997. (NON = non recherchée).

Céréales

Prélevée ou post levée:

La stratégie de désherbage doit être raisonnée en fonction de la sensibilité des parcelles à l'excès d'eau.

Dans le cas de sol sain et portant, le désherbage de post levée précoce est à préférer car plus économique. Dans les autres situations, le désherbage de prélevée doit être retenu car il constitue une certaine assurance..

Colza

Surveillez vos parcelles.

Céréales

Desherbage de prélevée.

Dépliants

Insecticides et herbicides des céréales.

Service Régional de
la Protection des
Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station
d'Avertissements
Agricoles de la DRAF
AUVERGNE

Le Directeur gérant :
D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.A.P n°23145AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 350 F
Fax : 320 F



DB 40 J 47245

P 158